- al-Lopes, F. J. Velloso, J. C. Campopiano [et al.] [Published online] // J. Diabet. Res. – 2015. – P. 20. – Available at: <https://www.hindawi.com/journals/jdr/2015/284680/>
14. Mattar, R. Comparison of fecal elastase 1 for exocrine pancreatic insufficiency evaluation between ex-alcoholics and chronic pancreatitis patients / R. Mattar, G. A. Lima, M. Z. da Costa [et al.] // Arquivos Gastroenterol. – 2014. – Vol. 51, № 4. – P. 297–301. doi: 10.1590/S0004-28032014000400006
 15. Raghuwansh, P. S. New Insulin into the Pathogenesis of Pancreatitis / P. S. Raghuwansh, K. D. Rajinder, K. S. Ashok // Curr. Opin. Gastroenterol. – 2013. – Vol. 29, № 5. – P. 523–530. doi: 10.1097/MOG.0b013e328363e399
 16. Sarner, M. Classification of pancreatitis / M. Sarner, P. B. Cotton // Gut. – 1984. – № 25. – P. 756–759.
 17. Yadav, D. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer / D. Yadav, A. B. Lowenfels // Gastroenterol. – 2013. – Vol. 144, № 6. – P. 1252–1261. doi: 10.1053/j.gastro.2013.01.068

References

1. Bordin D. S. *Jeksperimental'naja i klinicheskaja gastroenterologija. – Experimental and clinical gastroenterology.* 2011;7:122–129.
2. Bykova A. P., Kozlova I. V. *Jeksperimental'naja i klinicheskaja gastroenterologija. – Experimental and clinical gastroenterology.* 2016;11:69–75.
3. Gubergric N. B., Lukashevich G. M., Golubova O. A., Fomenko P. G. *Jeksperimental'naja i klinicheskaja gastroenterologija. – Experimental and clinical gastroenterology.* 2010;8:27–34.
4. Ivashkin V. T., Maev I. V., Ohlobystin A. V., Kucheryavij Ju. A., Truhmanov A. S., Sheptulin A. A., Shifrin O. S., Lapina T. L., Osipenko M. F., Simanenkova V. I., Hlynov I. B., Alekseenko S. A., Alekseeva O. P., Chikunova M. V. *Rossijskij zhurnal gastroenterologii, gepatologii, koloproktologii. – Russian magazine of gastroenterology, Hepatology, Coloproctology.* 2014;4:70–97.
5. Kozlova I. V., Pahomova A. L. *Jeksperimental'naja i klinicheskaja gastroenterologija. – Experimental and clinical gastroenterology.* 2015;6:4–10.
6. Mingazova S. K., Hasanova A. R., Nigmatullina A. Je., Musin A. G., Mutalova Je. G., Mingazetdinova L. N. *Medicinskij vestnik Bashkortostana. – Medical journal of Bashkortostan.* 2012;6:49–52.
7. Rusin V. I., Sirchak E. S., Filip S. S., Servetnik P. F. *Hirurgija. Vostochnaja Evropa. – Surgery. Eastern Europe.* 2016;4:545–552.
8. Sabel'nikova E. A. *Jeksperimental'naja i klinicheskaja gastroenterologija. – Experimental and clinical gastroenterology.* 2011;3:111–116.
9. Siraeva A. S., Faizova L. P. *Jeksperimental'naja i klinicheskaja gastroenterologija. – Experimental and clinical gastroenterology.* 2014;5:21–26.
10. Blaser M. J. *J. Clin. Invest.* 2014;10:4162–4165.
11. Etemad B., Whitcomb D. C. *Gastroenterology.* 2001;120(3):682–707.
12. Hoffmeister A., Mayerle J., Beglinger C., Büchler M. W., Büfler P., Däthel K., Friess H., Fölsch U., Izbicki J., Kahl S., Klar E., Keller J., Knoefel W. T., Luyer P., Lohr M., Meier R., Riemann J. F., Rünzi M., Schmid R. M., Schreyer A., Tribl B., Werner J., Witt H., Mössner J., Lerch M. M. *AWMF-online* 2012;115. Available at: <https://www.hindawi.com/journals/jdr/2015/284680/>
13. Leal-Lopes C., Velloso F. J., Campopiano J. C., Sogayar M. C., Correa R. G. *Journal of Diabetes Research.* 2015;20. Available at: <https://www.hindawi.com/journals/jdr/2015/284680/>
14. Mattar R., Lima G. A., da Costa M. Z., Silva-Elto J. M., Guarita D., Carrilho F. J. *Arquivos Gastroenterol.* 2014;51(4):297–301. doi: 10.1590/S0004-28032014000400006
15. Raghuwansh P. S., Rajinder K. D., Ashok K. S. *Curr. Opin. Gastroenterol.* 2013;29(5):523–530. doi: 10.1097/MOG.0b013e328363e399
16. Sarner M., Cotton P. B. *Gut.* 1984;25:756–759.
17. Yadav D., Lowenfels A. B. *Gastroenterol.* 2013;144(6):1252–1261. doi: 10.1053/j.gastro.2013.01.068

Сведения об авторах:

Быкова Анна Павловна, аспирант кафедры терапии; тел.: 89172163616; e-mail: vulpesruber@yandex.ru

Козлова Ирина Вадимовна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой; тел.: 89272770901; e-mail: kozlova@inbox.ru

© Коллектив авторов, 2017

УДК 616.62-008.22-053.2/.5

DOI – <https://doi.org/10.14300/mnnc.2017.12045>

ISSN – 2073-8137

ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КАК ФОНОВОЕ СОСТОЯНИЕ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ

А. С. Калмыкова, Н. А. Федько, В. А. Бондаренко, Н. В. Зарытовская,
О. И. Галимова, А. Н. Медведева

Ставропольский государственный медицинский университет, Россия

DISSOLUTION OF CONNECTIVE FABRIC AS BACKGROUND STATE IN CHILDREN WITH DISEASES OF URINARY SYSTEM ORGANS

Kalmykova A. S., Fedko N. A., Bondarenko V. A., Zarytovskaya N. V.,
Galimova O. I., Medvedeva A. N.

Stavropol State Medical University, Russia

Обследованы 215 детей и подростков с заболеваниями мочевой системы в возрасте 6–16 лет. Для оценки частоты и характера внешних стигм дизэмбриогенеза изучали 56 признаков, среднее число которых у детей с заболеваниями мочевой системы составило 7,95. В структуре висцеральных проявлений НСДСТ преобладали

инфравезикальная обструкция, дисметаболическая нефропатия и пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Часто регистрировался неблагоприятный преморбидный фон в виде отягощенной наследственности по заболеваниям почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.

При НСДСТ нередко имело место сочетание у одного больного диспластических изменений (нефроптоз, пиелоектазия) с пороками развития (удвоение чашечно-лоханочной системы, дистопия). Уровень оксалатов в группе детей с НСДСТ был достоверно выше, чем в группе с отсутствием признаков НСДСТ, что может характеризовать скрытую дисфункцию почек, не выявляемую общепринятыми методами.

Ключевые слова: дети, недифференцированный синдром дисплазии соединительной ткани, гипероксалурия

215 children with diseases of the urinary system aged 6–16, born in Stavropol, were examined. In assessing the frequency and nature of the external stigma of dysembryogenesis, 56 signs were studied in children and adolescents. The average number of signs per child in children with diseases of the urinary system was 7.95. In the structure of visceral manifestations of undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome (UCTDS) in children with diseases of the urinary system, infravesical obstruction, dysmetabolic nephropathy and vesicoureteral reflux prevailed. They often recorded an unfavorable premorbid background, which manifested itself as a burdened heredity for diseases of the kidneys, cardiovascular system, and gastrointestinal tract.

With UCTDS from the kidneys, there is often a combination of dysplastic changes in one patient (nephroptosis, pyeloectasia) with malformations (doubling of the cup-and-pelvis system, dystopia). In a comparative analysis of the oxalate content in the group of children with UCTDS, it was found that the level of oxalates was significantly higher than in the group of children who do not have UCTDS. Obviously, this group of people is characterized by latent kidney dysfunction, which is not detected by conventional methods.

Keywords: children, undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome, hyperoxaluria

В структуре патологии у детей и подростков значительную роль играют функциональные нарушения и состояния, связанные с недифференцированным синдромом дисплазии соединительной ткани (НСДСТ) [5, 6, 10, 13]. Синдром дисплазии соединительной ткани довольно часто сочетается с патологией почек [3, 7]. Примерно у каждого третьего пациента наблюдаются симптомы, характерные для поражения мочевыделительной системы: частое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, никтурия, энурез, симптомы дисметаболической нефропатии, а при углубленном обследовании выявляются: поликистоз, дивертикулез мочевого пузыря, нефроптоз, атония чашечно-лоханочной системы, удвоение почки и/или мочевыводящих путей [4, 6, 8, 10].

В детском возрасте изменения обмена веществ могут приводить к особым поражениям почек – нефропатиям. В мочу фильтруются избыточные количества солей, из них образуются кристаллы, которые повреждают мочевыводящие пути и способствуют формированию воспалительных процессов. Дети с нефропатиями могут в дальнейшем приобрести мочекаменную болезнь или вторичные поражения почек, мочевого пузыря [1, 3, 10].

Преобладание гипокинетического типа кровообращения, увеличение жесткости сосудистой стенки при НСДСТ могут приводить к нарушению внутрипочечной гемодинамики. В связи с этим наличие у пациентов клинических проявлений НСДСТ может рассматриваться как дополнительное условие к развитию взаимоотношающей патологии [2, 9, 11]. Функциональная неполноценность волокон соединительной ткани может вначале не проявляться, однако патологический материал способен накапливаться в поколениях, и у членов семьи проявляется то один, то другой признак [3, 7, 12].

Цель исследования: изучить характер и частоту фенотипических признаков НСДСТ, уровень оксалурии у детей с заболеваниями органов мочевой системы.

Материал и методы. Обследованы 215 детей и подростков с заболеваниями мочевой системы в воз-

расте 6–16 лет, с рождения проживающих в г. Ставрополе. Для оценки частоты и характера внешних стигм дизэмбриогенеза изучали 56 признаков. Определяли тип конституции, выполняли эхокардиографию с доплероанализом, УЗИ почек, микционную цистографию, экскреторную урографию.

Лабораторное исследование включало наряду с общепринятыми анализами определение содержания мочевины, креатинина, мочевой кислоты в сыворотке крови. Определение оксалатов в моче проводили методом Г. А. Сивориновского (1978). Нормальной считали экскрецию оксалатов $14,4 \pm 0,45$ мг/сутки.

Больные были распределены на 2 группы: дети с заболеваниями мочевой системы без признаков НСДСТ (I группа, 126 детей) и дети с заболеваниями мочевой системы, имеющие признаки НСДСТ (II группа, 89 детей). Соотношение девочек и мальчиков 2:1.

В первой группе у 47 детей наблюдался пиелонефрит, у 8 детей – инфекция мочевых путей, у 11 – первичный гломерулонефрит, у 21 – неинфицированные аномалии развития мочевой системы, у 28 – недифференцированные обменные нефропатии, у 2 – мочекаменная болезнь, у 2 детей – интерстициальный нефрит обменного генеза, по 1 ребенку было с наследственным нефритом и интерстициальным токсико-аллергическим нефритом.

Во второй группе пиелонефрит регистрировался у 46 детей, инфекция мочевых путей – у 4, первичный гломерулонефрит – у 8, аномалии развития мочевой системы – у 25, недифференцированные обменные нефропатии – у 22, мочекаменная болезнь – у 3, интерстициальный нефрит обменного генеза – у 2 обследованных.

Для статистической оценки результатов использовались методы: параметрический t-критерий Стьюдента, для определения доверительных границ долей (процентов) – метод углового преобразования Фишера. Достоверными считали различия при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. При анализе характера и частоты фенотипических признаков НСДСТ, обнаруживаемых при внешнем осмотре 215 детей с заболеваниями органов мочевой системы, у 89 были

выявлены такие стигмы дизэмбриогенеза, как широкая переносица и седловидный нос (63,6 %), астеническое телосложение (54,5 %), третий тип мочки уха (50,2 %), гипертелоризм (40,9 %), второй палец стопы больше первого (40,9 %), высокое небо (40,9 %), варусная деформация мизинца (34,7 %). Их мы отнесли во вторую группу.

В структуре висцеральных проявлений НСДСТ у детей с заболеваниями мочевой системы преобладали инфравезикальная обструкция, дисметаболическая нефропатия и пузырно-мочеточниковый рефлюкс, остальные аномалии определялись реже. Со стороны сердечно-сосудистой системы определялись аномально развитая хорда, открытое овальное окно, дисфункции митрального и/или трикуспидального клапана, пролапс митрального клапана (ПМК) (табл. 1).

Таблица 1

Структура висцеральных проявлений НСДСТ у детей с заболеваниями мочевой системы

Висцеральные проявления НСДСТ	Количество больных	%
Органы мочевой системы		
Инфравезикальная обструкция	48	53,9
Дисметаболическая нефропатия	21	23,6
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс	15	16,9
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря	14	15,7
Пиелозектазия	8	9,0
Удвоение чашечно-лоханочной системы	4	4,5
Нефроптоз	2	2,3
Сердце и сосуды		
Аномально развитая хорда	72	80,9
Открытое овальное окно	29	32,6
Дисфункция трикуспидального клапана	15	16,9
Дисфункция митрального клапана	8	9,0
Трикуспидальная регургитация	9	10,1
Митральная регургитация	13	14,6
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса	13	14,6
ПМК	15	16,9
Органы зрения		
Колобома диска зрительного нерва	2	2,3
Миопия	2	2,3
Врожденный птоз	4	4,6
Косоглазие	2	2,3
Астигматизм	3	3,4
Органы пищеварения		
Билиарная дисфункция	6	6,7
Аномалия/контурная деформация желчного пузыря	5	5,6
Долихосигма	7	7,9
Дискинезия толстого кишечника	2	2,3

Среднее число признаков-фенов у детей с заболеваниями мочевой системы составило 7,95. Легкая степень тяжести НСДСТ наблюдалась у 13,6 %, средняя степень тяжести – у 77,3 %, тяжелая степень – у 9,1 % детей.

При анализе анамнестических данных обследуемых детей выявлено, что наследственность достоверно чаще отягощена по заболеваниям органов мочевой системы (41,1 %) у детей с НСДСТ по сравнению с семьями I группы (24,4 %, $p < 0,05$) и представлена мочекаменной (46,4 %) и желчнокаменной болезнями (24,9 %),

остеохондрозами (49,4 %), сахарным диабетом (19,4 %). Около 20 % детей I группы и 68,2 % пациентов II группы имели отягощенный наследственный анамнез по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Заболевания желудочно-кишечного тракта регистрировались у 39,6 и 51,1 % родственников соответственно.

У большинства обследованных детей с НСДСТ (74,2 %) отмечался синдром дисплазии соединительной ткани сердца (СДСТС). При этом СДСТС наблюдался у 75 % детей с острым гломерулонефритом, у 100 % пациентов – с интерстициальным дисметаболическим нефритом, у 70 % – с острым пиелонефритом, у 72 % – с недифференцированными обменными нефропатиями, у 90 % – с аномалиями развития органов мочевой системы.

Исследование функциональных проб не выявило нарушения фильтрационной и концентрационной функций почек у детей с заболеваниями мочевой системы в обеих группах.

Высокое значение суточной экскреции оксалатов обнаружено в I группе детей с мочекаменной болезнью. У детей с НСДСТ эти показатели имели достоверно более высокое значение. Самый низкий уровень оксалурии определен у детей I группы, страдающих инфекциями нижних мочевыводящих путей. Гипероксалурия у детей, больных обструктивным пиелонефритом, II группы встречалась достоверно чаще по сравнению с I группой, причем у детей с НСДСТ показатели были более высокими ($p < 0,05$) (табл. 2).

Таблица 2

Экскреция оксалатов у детей с заболеваниями органов мочевой системы

Нозологические формы	Группа без признаков НСДСТ (n=126)		Группа с признаками НСДСТ (n=89)	
	Уровень экскреции (мг/сутки)	Кол-во детей с повышенным уровнем экскреции (%)	Уровень экскреции (мг/сутки)	Кол-во детей с повышенным уровнем экскреции (%)
Пиелонефрит: первичный обструктивный дисметаболический	22,9±8,4 36,1±2,5	75 64	43,4±9,1* 40,3±2,1	100 87,4
Инфекции нижних мочевых органов	35,5±3,1	75	38,9±8,1	35
Гломерулонефрит первичный	18,7±5,6	55	45,7±7,3	75
Аномалии развития органов мочевой системы	41,8±3,1	100	22,2±1,2*	42,6 %
Интерстициальный дисметаболический нефрит	60,5	100	5,3*	100
Мочекаменная болезнь	112,3±6,9	100	152±11,2*	100
Недифференцированные обменные нефропатии	47,5±2,6	74,7	36,5±2,8*	94,4

* $p < 0,05$ между группами детей, не имеющих и имеющих признаки НСДСТ.

Уровень оксалурии при дисметаболическом пиелонефрите у пациентов с НСДСТ был достоверно выше, чем в случаях с отсутствием признаков соединительнотканной дисплазии ($p \leq 0,05$). Аналогичное соотношение выявлено при гломерулонефрите, при первичном пиелонефрите. У больных с аномалиями развития органов мочевой системы, имеющих признаки НСДСТ, также достоверно чаще встречались случаи увеличения экскреции оксалатов ($p \leq 0,05$).

Заключение. Выявлено значительное повышение показателей суточной экскреции оксалатов с мочой у более чем 50 % детей с патологией органов мочевой системы. В структуре висцеральных проявлений НСДСТ у этой категории детей преобладали инфравезикальная обструкция, дисметаболическая нефропатия и пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Часто

регистрировался неблагоприятный преморбидный фон, проявляющийсяотягощенной наследственностью по заболеваниям почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. У больных с НСДСТ со стороны почек нередко имеет место сочетание диспластических изменений (нефроптоз, пиелозктазия) с пороками развития (удвоение чашечно-лоханочной системы, дистопия).

При сравнительном анализе установлено, что уровень оксалатов был достоверно выше в группе детей с НСДСТ, вероятно, имеющих скрытую дисфункцию почек, которая общепринятыми методами не выявляется. С другой стороны, гипероксалурия способствует возникновению или поддержанию уже имеющегося патологического процесса в почках, что требует её раннего выявления и коррекции.

Литература

1. Арсентьев, В. Г. Дисплазия соединительной ткани у детей как конституциональная основа полиорганных нарушений: вопросы классификации, критерии диагностики / В. Г. Арсентьев, Н. П. Шабалов // Вопросы практической педиатрии. – 2011. – Т. 6, № 5. – С. 59–65.
2. Багдасарова, И. В. Изучение клинко-лабораторных особенностей при дисметаболических нефропатиях у детей / И. В. Багдасарова, Т. В. Стоева, Н. И. Желтковская // Перинатология и педиатрия. – 2009. – № 6. – С. 71–73.
3. Вьюшкова, Н. В. Дисплазия соединительной ткани как фоновое состояние при пиелонефрите / Н. В. Вьюшкова // Кубанский научный медицинский вестник. – 2009. – № 6 (111). – С. 27–30.
4. Гнусаев, С. Ф. Дисплазии соединительной ткани у детей и подростков / С. Ф. Гнусаев // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. – 2013. – Т. 92, № 4. – С. 13–18.
5. Земцовский, Э. В. Недифференцированные дисплазии соединительной ткани. Состояние и перспективы развития представлений о наследственных расстройствах соединительной ткани / Э. В. Земцовский // Дисплазия соединительной ткани. – 2008. – № 1. – С. 5–9.
6. Иванова, И. И. Особенности течения болезней мочевыделительной системы у детей с дисплазией соединительной ткани / И. И. Иванова, С. Ф. Гнусаев, Н. Ю. Коваль // Российский педиатрический журнал. – 2014. – № 4. – С. 32.

References

1. Arsent'ev V. G., Shabalov N. P. *Voprosy prakticheskoy pediatrii. – Questions of practical pediatrics.* 2011; 5(6):59-65.
2. Bagdasarova I. V., Stoeva T. V., Zheltkovskaja N. I. *Perinatologija i pediatrija. – Perinatology and pediatrics.* 2009;6:71-73.
3. Vyushkova N. V. *Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. – Kuban scientific medical bulletin.* 2009;6(111);27-30.
4. Gnusaev S. F. *Pediatrija. Zhurnal im. G. N. Speranskogo. – Journal Pediatrics named after G. N. Speransky.* 2013;4(92):13-18.
5. Zemcovskij Je. V. *Displazija soedinitel'noj tkani. – Connective tissue dysplasia.* 2008;1:5-9.
6. Ivanova I. I., Gnusaev S. F., Koval' N. Ju. *Rossijskij pediatricheskij zhurnal. – Russian Pediatric Journal.* 2014;4:32.

7. Кадурина, Т. И. Дисплазия соединительной ткани : руководство для врачей / Т. И. Кадурина, В. Н. Горбунова. – СПб. : ЭЛБИ, 2009. – 714 с.
8. Крупнова, М. Ю. Факторы риска развития и прогрессирования ХБП / М. Ю. Крупнова, М. В. Бондаренко, В. В. Марасаев // Клиническая нефрология. – 2013. – № 5. – С. 53–59.
9. Лялюкова, Е. А. Структурно-функциональные особенности сосудов брюшной полости у пациентов с дисплазией соединительной ткани / Е. А. Лялюкова, Н. И. Орлова, С. И. Аксенов // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2012. – № 4. – С. 21–25.
10. Максудова, А. Н. Исходы дисметаболических нефропатий: результаты ретроспективного исследования / А. Н. Максудова, И. Г. Салихов, С. В. Мальцев // Клиническая нефрология. – 2011. – № 5. – С. 51–53.
11. Семейные проявления недифференцированного синдрома дисплазии соединительной ткани и ассоциированная соматическая патология / А. С. Калмыкова, Н. А. Федько, Н. В. Зарытовская, В. С. Калмыкова // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2016. – Т. 11, № 2. – С. 264–267.
12. Carla, G. Genetic determinants of urolithiasis / G. Carla, Monico and Dawn S. Milliner // *Nat. Rev. Nephrol.* – 2012. – Vol. 8, № 3. – P. 151–162. doi: 10.1038/nrneph.2011.211
13. Mosca, M. Mixed connective tissue diseases: new aspects of clinical picture, prognosis and pathogenesis / M. Mosca // *Isr. Med. Assoc. J.* – 2014. – Vol. 16, № 11. – P. 725–726.

7. Kadurina T. I., Gorbunova V. N. *Displazija soedinitel'noj tkani: rukovodstvo dlja vrachej.* SPb.: «ELBI», 2009.
8. Krupnova M. Yu., Bondarenko M. V., Marasaev V. V. *Klinicheskaya nefrologiya. – Clinical Nephrology.* 2013;5:53-59.
9. Lyalyukova E. A., Orlova N. I., Aksenov S. I. *Vestnik rentgenologii i radiologii. – Herald of Radiology and Radiology.* 2012;4:21-25.
10. Maksudova A. N., Saliyov I. G., Mal'cev S. V. *Klinicheskaya nefrologiya. – Clinical Nephrology.* 2011;5:51-53.
11. Kalmykova A. S., Fed'ko N. A., Zarytovskaja N. V., Kalmykova V. S. *Medicinskii vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical news of the North Caucasus.* 2016;2(11): 264-267.
12. Carla G., Milliner Monico and Dawn S. *Nat. Rev. Nephrol.* 2012;8:151. doi: 10.1038/nrneph.2011.211
13. Mosca M. *Isr. Med. Assoc. J.* 2014;16(11):725-726.

Сведения об авторах:

Калмыкова Ангелина Станиславовна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней; тел.: (8652)352970; e-mail: kangeline@mail.ru

Федько Наталья Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии; тел.: (8652)358188; e-mail: fedko_natalya@mail.ru

Бондаренко Валентина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент; тел.: (8652)358188; e-mail: childdissl@stgmu.ru

Зарытовская Наталья Владимировна, доктор медицинских наук, профессор; тел.: (8652)370695; e-mail: leda54@mail.ru

Галимова Ольга Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент; тел.: (8652)358188; e-mail: childdissl@stgmu.ru

Медведева Анастасия Николаевна, кандидат медицинских наук, ассистент; тел.: (8652)232107; e-mail: anzagrubina@mail.ru