4. Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации. 2017 год. Под ред. А. Ю. Воронковой, Е. Л. Амелиной, Н. Ю. Каширской, Е. И. Кондратьевой, С. А. Красовского [и др.]. М.: «МЕДПРАКТИКА-М»; 2019. [Register of patients with cystic fibrosis in the Russian Federation. 2017. Edited by Voronkova A. Yu., Amelina E. A., Kashirskaya N. Yu., Kondratieva E. I., Krasovsky S. A. [et al.]. M.: «MEDPRAKTIKA-M»; 2019. (In Russ.)].
5. Петрова Н. В., Кондратьева Е. И., Красовский С. А., Поляков А. В., Иващенко Т. Э. [и др.]. Проект национального консенсуса «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия». Раздел «Генетика муковисцидоза. Молекулярно-генетическая диагностика при муковисцидозе». *Медицинская генетика*. 2016;11(173):29-45. [Petrova N. V., Kondratyeva E. I., Krasovsky S. A., Polyakov A. V., Ivashchenko T. E. [et al.]. National Consensus Project «Cystic fibrosis: definition, diagnostic criteria, treatment» Section «Genetics of Cystic Fibrosis. Molecular genetic diagnosis of cystic fibrosis». *Meditsinskaya Genetika. – Medical genetics*. 2016;11(173):29-45. (In Russ.)].
6. Сайт о странах, городах, статистике населения и пр. Режим доступа: <http://www.statdata.ru/naselenie-federalnyh-okrugov-rossii>. Ссылка активна на 14.01.2020. [Website about countries, cities, population statistics, etc. Available at: <http://www.statdata.ru/naselenie-federalnyh-okrugov-rossii>. Accessed 14 January, 2020. (In Russ.)].
7. Кузнецов В. А. Введение в кавказоведение (историко-этнологические очерки народов Северного Кавказа). Владикавказ: ИПП им. В. А. Гассиева, 2004. [Kuznetsov V. A. Introduction to the study of Caucasus (historical and ethnological reviews of the ethnic groups of the North Caucasus). Vladikavkaz: Publisher V. A. Gassiev, 2004. (In Russ.)].
8. Иващенко Т. Э., Баранов В. С. Биохимические и молекулярно-генетические основы патогенеза муковисцидоза. Санкт-Петербург: «Интермедика»; 2002. [Ivashchenko T. E., Baranov V. S. Biochemical and molecular genetic basics of cystic fibrosis pathogenesis. Saint-Petersburg: «Intermedika»; 2002. (In Russ.)].
9. The molecular genetic epidemiology of cystic fibrosis. Report of a Joint Meeting of WHO/ECFTN/ICF(M)/ECFS. World Health Organization (WHO). Genoa, 2002. Human Genetics Programme, 2004. Available at: https://www.cfw.org/docs/who/2002/who_hgn_cf_wg_04.02.pdf. Accessed 14 January, 2020.
10. Petrova N. V., Kashirskaya N. Yu., Vasilieva T. A., Timkovskaya E. E., Voronkova A. Yu. [et al.]. High proportion of W1282X mutation in CF patients from Karachai-Cherkessia. *J. Cyst. Fibrosis*. 2016;15(3):e28-e32. <https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.02.003>

Сведения об авторах:

Петрова Ника Валентиновна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии; тел.: 84993206090; e-mail: npetrova63@mail.ru

Каширская Наталия Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии; тел.: 84993241224; e-mail: kashirskayanj@mail.ru

Кондратьева Елена Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-клинического отдела муковисцидоза; тел.: 84955873366; e-mail: elenafpk@mail.ru

Гетоева Залина Казбековна, кандидат медицинских наук, врач генетик-гинеколог; тел.: 88672405647

Васильева Татьяна Алексеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии; тел.: 84993241224; e-mail: vasilyeva_debrie@mail.ru

Воронкова Анна Юрьевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник научно-клинического отдела муковисцидоза; тел.: 84955873366; e-mail: voronkova111@yandex.ru

Шерман Виктория Давидовна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник научно-клинического отдела муковисцидоза; тел.: 84955873366; e-mail: tovika@yandex.ru

Зинченко Рена Абульфазовна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории генетической эпидемиологии; тел.: 84993241224; e-mail: renazinchenko@mail.ru

© Коллектив авторов, 2020

УДК 575.224, 616.062

DOI – <https://doi.org/10.14300/mnnc.2020.15043>

ISSN – 2073-8137

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ПАТОГЕННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ГЕНА *CFTR* У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Н. А. Ильенкова¹, В. В. Чикунов¹, Е. И. Кондратьева²

¹ Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Российская Федерация

² Медико-генетический научный центр им. академика Н. П. Бочкова, Москва, Российская Федерация

FEATURES OF SPECTRUM OF PATHOGENIC GENETIC VARIANTS OF THE *CFTR* GENE IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS FROM KRASNOYARSK TERRITORY

Ilenkova N. A.¹, Chikunov V. V.¹, Kondratyeva E. I.²

¹ Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetski, Russian Federation

² Research Center for Medical Genetics, Moscow, Russian Federation

Частота генетически значимых мутаций гена *CFTR* в разных популяциях варьирует. В исследовании изучались особенности и разнообразие спектра патогенных вариантов гена *CFTR* (ABCC7) у 88 больных с МВ в Красноярском крае. Выявлено 19 патогенных генетических вариантов гена *CFTR*. Суммарная доля 8 генетических

вариантов: с.1521_1523delCTT (F508del), с.54-5940_273+10250del21kb (CFTRdele2,3), с.3909C>G (N1303K), с.2012delT (2143delT), с.2052_2053insA (2184insA), с.262_263delTT (394delTT), с.3484C>T (R1162X), с.(273+1_274-1)(1679+1_1680-1)del (CFTRdele4-10), – составляет 76,68 %. Обнаружено девять редких вариантов однократно и в двух случаях дважды. Таким образом, выявлено разнообразие патогенных вариантов последовательности гена *CFTR* у больных МВ в Красноярском крае с определением спектра, частоты их встречаемости и распределения в зависимости от класса и типа.

Ключевые слова: муковисцидоз, ген *CFTR*, Красноярский край, дети, молекулярная диагностика

The frequency of genetically significant mutations of the *CFTR* gene in different populations varies. The study examined the characteristics and diversity of the spectrum of pathogenic variants of the *CFTR* gene (ABCC7) in patients with CF 88 patients with CF in the Krasnoyarsk Territory. 19 pathogenic genetic variants of the *CFTR* gene were identified. The total share of 8 genetic variants: с.1521_1523delCTT (F508del), с.54-5940_273+10250del21kb (CFTRdele2,3), с.3909C>G (N1303K), с.2012delT (2143delT), с.2052_2053insA (2184insA), с.262_263delTT (394delTT), с.3484C>T (R1162X), с.(273+1_274-1)(1679+1_1680-1)del (CFTRdele4-10) – is 76.68 %. Nine rare variants were detected once and in two cases twice. Thus, a variety of pathogenic variants of the *CFTR* gene sequence was revealed in CF patients in the Krasnoyarsk Territory, with a determination of the spectrum, their frequency of occurrence and distribution, depending on class and type.

Keywords: cystic fibrosis, *CFTR* gene, Krasnoyarsk region, children, molecular diagnostic

Для цитирования: Ильенкова Н. А., Чикунов В. В., Кондратьева Е. И. ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ПАТОГЕННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ГЕНА *CFTR* У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. *Медицинский вестник Северного Кавказа*. 2020;15(2):178-181. DOI – <https://doi.org/10.14300/mnnc.2020.15043>

For citation: Ilenkova N. A., Chikunov V. V., Kondratyeva E. I. FEATURES OF SPECTRUM OF PATHOGENIC GENETIC VARIANTS OF THE *CFTR* GENE IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS FROM KRASNOYARSK TERRITORY. *Medical News of North Caucasus*. 2020;15(2):178-181. DOI – <https://doi.org/10.14300/mnnc.2020.15043> (In Russ.)

МВ – муковисцидоз
CFTR – муковисцидозный трансмембранный регулятор проницаемости

MLPA – мультиплексная пробозависимая лигазная реакция с амплификацией
NGS – секвенирование нового поколения

Муковисцидоз (МВ) – наиболее распространенное тяжелое моногенное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, обусловленное патогенными генетическими вариантами гена, кодирующего белок, участвующий в транспорте ионов хлора через клеточную мембрану (*CFTR*; *ABCC7*). Ген *CFTR* расположен в регионе 31.1 длинного плеча 7-й хромосомы (7q31.1) и содержит 27 экзонов [1].

Заболевание характеризуется поражением экзокринных желез и кистозным перерождением поджелудочной железы из-за закупорки выводящих протоков вязким секретом, что вызвано изменениями функций хлорных каналов мембран эпителиальных клеток. Вариативность клинической картины определяется многообразием дефектов гена *CFTR*. Изучено более 2200 вариантов последовательности гена *CFTR*, большая часть из них – патогенные, некоторые из них с неясной клинической значимостью, а также не имеющие клинических последствий [2, 3].

Частота диагностически значимых мутаций гена *CFTR* в разных популяциях варьирует, что обуславливает появление сложностей во время разработки региональных протоколов молекулярно-генетической диагностики и внедрения таргетной терапии при лечении больных МВ [4, 5, 6].

Красноярский край расположен в Восточной и Западной Сибири, в русле реки Енисей. Национальный состав региона отличается большим разнообразием (результат этнических, политических, культурных, а также демографических процессов). В связи с историческими событиями определение распространенности частых мутаций среди больных МВ в популяциях с разным этнографическим составом может оказать значимую помощь при проведении медико-генетического консультирования населения.

Целью исследования явилось изучение особенностей и разнообразия спектра патогенных генетических вариантов гена *CFTR* у больных МВ в Красноярском крае.

Материал и методы. В исследовании анализировались результаты медико-генетического обследования больных с муковисцидозом, зарегистрированных на территории Красноярского края и состоящих на учёте в Красноярском региональном центре МВ. Объем выборки больных МВ составил 88 пациентов из 85 семей в возрасте от 0 до 24 лет. Выборка формировалась по мере обращения в «Центр муковисцидоза» в период с 1998 по 2019 г. Для анализа спектра мутаций в Красноярском крае проанализировано 88 ДНК-заключений.

Молекулярно-генетическая диагностика проведена согласно консенсусу «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия», раздел «Генетика муковисцидоза. Молекулярно-генетическая диагностика при муковисцидозе» [7, 8].

У 20 пациентов с клинической картиной МВ патологический аллель не идентифицирован, в связи с чем их биологический материал был направлен в НИИ медицинской генетики НИМЦ РАН г. Томска.

Для выявления мутаций гена *CFTR* использовались следующие методы: мультиплексной амплификации (выявление инсерционно/делеционных вариантов), метод аллель-специфичного лигирования с последующей амплификацией (регистрация точечных нуклеотидных замен), метод рестрикционного анализа, метод прямого секвенирования по Сенгеру (исследование нуклеотидной последовательности кодирующей области гена *CFTR* *Applied Biosystems*), методом количественной MLPA (проведение анализа протяженных перестроек гена *CFTR*).

Интерпретацию выявленных мутаций гена *CFTR* по патогенности проводили согласно современным базам данных [9, 10].

После идентификации мутации гена *CFTR* была определена частота аллелей выявленных мутаций с последующей верификацией «тяжести» генотипа. Согласно современным определениям «тяжелый» генотип – это генотип с обязательным наличием мутации I–III класса, «мягкий» генотип – наличие у пациента хотя бы 1 мутации IV–VI классов.

Результаты и обсуждение. Молекулярно-генетическое исследование было проведено всем боль-

ным, которые состоят на учете в региональном центре МВ.

Мутантные аллели идентифицированы в 88,3 % случаев. Оба патогенных аллеля выявлены у 70,45 % обследуемых, один аллель – у 23,86 %, оба мутантных аллеля не идентифицированы у 5,69 % пациентов. Всего выявлено 19 патогенных генетических вариантов гена *CFTR*. В таблице 1 в порядке убывания представлены относительные частоты генетических вариантов гена *CFTR* среди больных МВ.

Таблица 1

**Патогенные генетические варианты гена *CFTR*
у пациентов с муковисцидозом в Красноярском крае**

Название по cDNA	Название по положению в белке	Традиционное название	Класс	Характер нарушения функции белка	Классификация в базе CFTR2 [9]	Частота (%)
c.1521_1523delCTT	p.(Phe508del)	F508del	II	тяжелый	патогенный	61,93
c.54-940_273+10250del21kb	p.(Ser18Argfs*16)	CFTRdcl2,3 (del21kb)	I	тяжелый	патогенный	3,98
c.3909C>G	p.(Asn1303Lys)	N1303K	II	тяжелый	патогенный	2,27
c.262_263delTT	p.(Leu88Ilefs*22)	394delTT	I	тяжелый	патогенный	1,70
c.3484C>T	p.(Arg1162*)	R1162X	I	тяжелый	патогенный	1,70
c.2012delT	p.(Leu671*)	2143delT	I	тяжелый	патогенный	1,70
c.2052_2053insA	p.(Gln685Thrfs*4)	2184insA	I	тяжелый	патогенный	1,70
c.(273+1_274-1) (1679+1_1680-1)del	Нет	CFTRdele4-10*	I	тяжелый	патогенный	1,70
c.3472C>T	p.(Arg1158*)	R1158X	I	тяжелый	патогенный	1,14
c.1000C>T	p.(Arg334Trp)	R334W	IV	мягкий	патогенный	1,14
c.350G>A	p.(Arg117His)	R117C	IV	мягкий	варьирующие клинические проявления	0,57
c.2052delA	p.(Lys684Asnfs*38)	2184delA	I	тяжелый	патогенный	0,57
c.3816_3817delGT	p.(Ser1273Leufs*28)	3944delGT	I	тяжелый	не описан	0,57
c.3908delA	p.(Asn1303Thrfs*25)	4040delA	I	тяжелый	патогенный	0,57
c.1766+1G>A	Нет	1898+1G>A	I	тяжелый	патогенный	0,57
c.274G>A	p.(Glu92Lys)	E92K	IV(?)	мягкий	патогенный	0,57
c.413_415dupTAC	p.(Leu138dup)	L138ins	IV	мягкий	патогенный	0,57
c.1657C>T	p.(Arg553*)	R553X	I	тяжелый	патогенный	0,57
c.1210–12 [5]	Нет	5T	V	мягкий	варьирующие клинические проявления	0,57

* Нумерация экзонов согласно традиционной номенклатуре.

Суммарная доля 8 генетических вариантов: c.1521_1523delCTT (F508del), c.54-940_273+10250del21kb (CFTRdcl2,3), c.3909C>G (N1303K), c.2012delT (2143delT), c.2052_2053insA (2184insA), c.262_263delTT (394delTT), c.3484C>T (R1162X), c.(273+1_274-1)(1679+1_1680-1)del (CFTRdele4-10), – составляет 76,68 %. Девять вариантов обнаружены однократно: c.350G>A (R117C), c.2052delA (2184delA), c.3816_3817delGT (3944delGT), c.3908delA (4040delA), c.1766+1G>A (1898+1G>A), c.274G>A (E92K), c.413_415dupTAC (L138ins), c.1657C>T (R553X), c.1210–12[5] (5T); дважды выявлены c.3472C>T (R1158X), c.1000C>T (R334W).

Вместе с тем у 11,7 % пациентов с МВ не удалось обнаружить двух патогенных вариантов, несмотря на выполнение расширенного анализа, который включал секвенирование кодирующей области и поиск перестроек гена *CFTR*. Данная ситуация может быть связана с расположением неизвестных ранее патогенных вариантов во внутренних регионах интронов или в регуляторных областях гена *CFTR*, а также в регуляторных регионах вне гена *CFTR*, атипичными случаями МВ или МВ-подобными состояниями, связанными с нарушением работы других генов.

При анализе класса выявленных генетических вариантов: 63,16 % (n=12) относятся к I классу (нонсенс-

мутации сдвига рамки точки сплайсинга), 10,53 % (n=2) – ко II (миссенс-мутации), 21,06 % (n=4) – к IV (миссенс-мутации), 5,25 % (n=1) – к V (нарушение сплайсинга).

Мутации III и VI классов у больных МВ в Красноярском крае не встречались.

Таким образом, у больных МВ в Красноярском крае преобладают генетические варианты мутации гена *CFTR* I, II классов (приводят к серьезным нарушениям функции белка *CFTR*). У 26,31 % больных выявлен «мягкий» генотип (табл. 2).

Заключение. Результаты работы демонстрируют разнообразие патогенных вариантов последовательности гена *CFTR* у больных МВ в Красноярском крае, с определением спектра и частоты их встречаемости. Выявленные генетические варианты описаны в зависимости от класса и типа. Полученные результаты работы важны для медико-генетического консультирования семей больных (определение и исключение носительства патологических мутаций у ближайших родственников, планирование семьи, в том числе оценка риска, возможная дородовая диагностика в отягощенных семьях). Точный молекулярный диагноз важен для возможных в последующем персонализированных рекомендаций по лечению пациентов в зависимости от выявляемых у них генных нарушений.

Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Литература/References

1. Strausbaugh S. D., Davis P. B. Cystic fibrosis: a review of epidemiology and pathobiology. *Clin. Chest Med.* 2007;(28):279-288. <https://doi.org/10.1016/j.ccm.2007.02.011>
2. EXAC The Exome Aggregation Consortium (Exac) Database. Available at: <https://macarthurlab.org/2014/11/18/a-guide-to-the-exome-aggregation-consortium-exac-data-set>. Accessed March 02, 2020.
3. De Boeck K., Vermeulen F., Dupont L. The diagnosis of cystic fibrosis. *Presse Medicale.* 2017;46(6Pt2):97-108. <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2017.04.010>
4. Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации. 2017 год. Под ред. А. Ю. Воронковой, Е. Л. Амелиной, Н. Ю. Каширской, Е. И. Кондратьевой, С. А. Красовского [и др.]. М.: «МЕДПРАКТИКА-М», 2019. [The register of patients with cystic fibrosis in the Russian Federation. 2017 year. Ed. by Voronkova A. Yu., Amelina E. L., Kashirsky N. Yu., Kondratyeva E. I., Krasovsky S. A. [et al.]. M.: MEDPRAKTIKA-M, 2019. (In Russ.)].
5. Krasovskiy S., Cherniak A., Kashirskaya N., Kondratyeva E., Amelina E. [et al.]. Features of the clinical course of cystic fibrosis due to the severity of the genotype (according to the Cystic Fibrosis Patient Registry of the Russian Federation (2017)). *J. Cystic Fibrosis.* 2019;1(18):58-59.
6. Ильенкова Н. А., Чикунов В. В. Динамика продолжительности жизни больных муковисцидозом в Красноярском крае: ретроспективный анализ 1998–2016 гг. *Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского.* 2017;2:63-167. [Ilenkova N. A., Chikunov V. V. Dynamics of life expectancy of patients with cystic fibrosis in Krasnoyarsk region: a retrospective analysis of 1998-2016. *Pediatrics. Zhurnal im. G. N. Speranskogo.* – *Pediatrics. Journal of Pediatrics.* G. N. Speranskoy. 2017;(2):163-167. (In Russ.)].

Сведения об авторах:

Ильенкова Наталья Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детских болезней с курсом ПО; тел.: 83912640961; e-mail: ilenkova1@mail.ru; ORCID: 0000-0001-8058-7806

Чикунов Владимир Викторович, кандидат медицинских наук, доцент; тел.: 83912640961; e-mail: doctorvov@mail.ru; ORCID: 0000-0001-6011-2360

Кондратьева Елена Ивановна, доктор медицинских наук, профессор; тел.: 84955873366; e-mail: elenafpk@mail.ru; ORCID: 0000-0001-6395-0407

Таблица 2

Спектр выявленных генетических вариантов в зависимости от «тяжести» генотипа у больных МВ Красноярского края

N	Генотипы	%
«Тяжелые» генотипы		
1	F508del/F508del	34,09
2	F508del/N1303K	4,54
3	F508del/394delTT	3,41
4	F508del/2143delT	3,41
5	F508del/CFTRdele4-10	2,27
6	F508del/CFTRdel2,3	2,27
7	CFTRdel2,3/CFTRdel2,3	2,27
8	2184insA/R1158X	2,27
9	R1162X/CFTRdele4-10	3,41
10	F508del/2184insA	1,14
11	F508del/1898+1G>A	1,14
12	F508del/R553X	1,14
13	F508del/2184delA	1,14
14	F508del/4040delA	1,14
15	F508del/3944delTG	1,14
Всего		65,78
«Мягкие» генотипы		
1	F508del/E92K	1,14
2	F508del/L138ins	1,14
3	R117C/CFTRdel2,3	1,14
4	F508del/R334W	2,27
Всего		5,69
Неидентифицированный вариант генотипа		
1	F508del/N	23,86
2	N/N	5,67
Всего		29,53

7. Петрова Н. В., Кондратьева Е. И., Красовский С. А., Поляков А. В., Иващенко Т. Э. [и др.]. Проект национального консенсуса «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия». Раздел «Генетика муковисцидоза. Молекулярно-генетическая диагностика при муковисцидозе». *Медицинская генетика.* 2016;11(173):29-45. [Petrova N. V., Kondratyeva E. I., Krasovsky S. A., Polyakov A. V., Ivashchenko T. E. [et al.]. National Consensus Project Cystic fibrosis: definition, diagnostic criteria, treatment Section Genetics of Cystic Fibrosis. Molecular genetic diagnosis of cystic fibrosis. *Medicinskaya genetika.* – *Medical Genetics.* 2016;11(173):29-45. (In Russ.)].
8. Richards S., Aziz N., Bale S., Bick D., Das S. [et al.]. Laboratory Quality Assurance Committee Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genetics in Medicine.* 2015;17(5):405-424. <https://doi.org/10.1038/gim.2015.30>
9. Рыжкова О. П., Кардымон О. Л., Прохорчук Е. Б., Коновалов Ф. А., Маслеников А. Б. [и др.]. Руководство по интерпретации данных, полученных методом массового параллельного секвенирования (MPS). *Медицинская генетика.* 2017;(7):4-17. [Ryzhkova O. P., Kardimon O. L., Prohorchuk E. B., Kononov F. A., Maslennikov A. B. [et al.]. Guidelines for the interpretation of massive sequencing variants. *Medicinskaya genetika.* – *Medical Genetics.* 2017;(7):4-17. (In Russ.)].
10. Clinical and Functional Translation of CFTR (CFTR2). Available at: <https://cftr2.org>. Accessed September 02, 2020.